

Histoire clinique

M. DA... : agent de fabrication de peintures

Agent de fabrication de peintures présentant diverses éruptions cutanées éczématiformes, sèches de la face dorsale des mains, des faces postérieures des avant-bras et des coudes, de la face antérieure du cou dont l'origine professionnelle est évoquée.

Premières lésions cutanées sur la face dorsale des mains, à la suite de projections d'un produit liquide ACTICIDE SPX®. Enquête allergologique : polysensibilisation au nickel et au Kathon CG. Cette dernière allergie est en rapport avec une sensibilisation cutanée de contact, induite par les manipulations du produit liquide ACTICIDE SPX® (mélange d'isothiazolinones).

Atmosphère de travail empoussiérée (poudres...). Eruptions cutanées sur les zones découvertes...



Eruptions éczématiformes excoriées par le grattage sur la face dorsale des mains. Lavage des mains avec du white-spirit
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Eruptions eczématiformes excoriées par le grattage sur la face dorsale des mains. (macro) (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Lésions eczématiformes, sèches, excoriées par le grattage de la face postérieure de l'avant-bras et du coude gauches (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Lésions eczématiformes, sèches, excoriées par le grattage des faces postérieures des avant-bras et des coudes (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Eruption eczématiforme de la face antérieure du cou (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Test positif, à deux croix, avec le kathon CG à la 48^{ème} heure.
Manipulations, avec projections accidentelles, du produit ACTICIDE
SPX[®]. contenant un mélange d'isothiazolinones
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Tests positifs, à deux croix, au sulfate de nickel et au kathon CG à la
72^{ème} heure. Allergie cutanée de contact à la chaîne portée, contenant
du nickel (Photo Dr M-B. Cleenewerck)